ASFIKSIA PERINATAL SEBAGAI FAKTOR RESIKO GANGGUAN PENDENGARAN PADA ANAK

Sukri Rahman, Hanifatryevi

Bagian Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala Leher
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas/RS Dr. M. Djamil Padang
email : sukri_rahman@yahoo.com

Abstrak

Asfiksia adalah keadaan di mana tubuh atau bagian tubuh kekurangan oksigen. Jika kondisi ini terjadi pada bayi baru lahir disebut dengan asfiksia perinatal, yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan secara permanen maupun bersifat sementara, salah satunya adalah gangguan pendengaran sensorineural. Makalah ini akan membahas tentang mekanisme gangguan pendengaran akibat asfiksia, deteksi dini gangguan pendengaran dengan pemeriksaan *Brain Evoked Response Auditory (BERA)* dan *Otoacoustic Emissions (OAE)*. Gangguan pendengaran akibat asfiksia dapat terjadi akibat beberapa mekanisme. Kelainan ini terlihat pada gambaran BERA dan OAE, dimana terjadinya peningkatan masalaten dan interval gelombang yang bersifat sementara atau menetap, serta ditemukan gangguan pada fungsi koklea bayi dengan asfiksia perinatal terutama pada frekuensi 1-5 kHz yang terdeteksi pada hari ke tiga sampai hari kelima kelahiran, dan terdapat perbaikan pada usia 1 bulan.

Kata Kunci : Asfiksia perinatal, gangguan pendengaran, BERA, OAE

Abstract

Asphyxia is a condition in which the body or body part to lack of oxygen. If this condition occurs in newborns with perinatal asphyxia is also called, which can cause tissue damage is permanent or temporary. One of that is a sensorineural hearing loss.

This paper will discuss the mechanisms of hearing loss due to asphyxia, early detection of hearing loss with an examination Brain Auditory Evoked Response (BERA) and Otoacoustic Emissions (OAE).

Hearing loss due to asphyxia can occur due to several mechanisms. These abnormalities are seen on the results of BERA and OAE, where an increase in latent period and the interval waves that are temporary or permanent, and found interference with the function of the cochlea infants with perinatal asphyxia, especially at frequency of 1-5 kHz were detected on the third day until the fifth day of birth, and there are improvements to the age of 1 month.

Key word : Perinatal asphyxia, hearing loss, Brain Auditory Evoked Response, Otoacoustic Emissions

Pendahuluan

Asfiksia adalah keadaan di mana tubuh atau bagian tubuh kekurangan oksigen. Jika kondisi ini terjadi pada bayi baru lahir disebut juga dengan asfiksia perinatal. Resiko dari asfiksia perinatal mulai dari berbagai derajat gangguan saraf dan motorik sampai menyebabkan kematian.⁽¹⁻³⁾ Akibat yang ditimbulkan tergantung pada lokasi dan luasnya jaringan yang mengalami kerusakan.⁽⁴⁾ Salah satu gejala sisa yang sering terjadi pada asfiksia perinatal adalah gangguan pendengaran sensorineural.^(1,2)

Prevalensi gangguan pendengaran sedang hingga sangat berat bilateral pada bayi baru lahir adalah 1–6 per 1000 kelahiran, yang mana 10% nya merupakan gangguan pendengaran yang sangat berat.⁽⁶⁾ Kezirian menuliskan prevalensi gangguan pendengaran sebesar 1–3 per 1000 bayi.⁽⁷⁾

American Academy of Pediatric Joint Committee tahun 1993 menyatakan asfiksia perinatal merupakan salah satu faktor risiko terjadinya gangguan pendengaran, disamping faktor risiko lainnya seperti riwayat keluarga, kelainan struktur kepala dan leher, infeksi saat hamil, lahir prematur, berat badan lahir rendah, persalinan dengan tindakan, bayi kuning. Anak dengan satu faktor risiko akan memiliki kemungkinan 10 kali lebih besar mengalami gangguan pendengaran dan 63 kali lebih besar jika disertai dua faktor risiko lainnya.⁽⁸⁾

Angka kejadian asfiksia perinatal bervariasi di masing-masing negara, sekitar 2 sampai 9 dari setiap 1000 kelahiran hidup. Penelitian di California dari tahun 1991-2000 didapatkan angka kejadian asfiksia perinatal sebesar 4.5 setiap 1000 kelahiran hidup, di *British Hospital* angka kejadian asfiksia sangat

menurun dari 7.7 per 1000 kelahiran hidup pada akhir 1970 menjadi 1.9 per 1000 kelahiran hidup di tahun 1990. Di Swedia angka kejadian asfiksia perinatal berkisar 1,8 sampai 6,9 setiap 1000 kelahiran hidup.⁽⁵⁾

Menemukan gangguan pendengaran pada bayi tidak mudah, tanpa program skrining pendengaran gangguan pendengaran baru diketahui pada usia 18 – 24 bulan.^(6,7)

Tujuan skrining pendengaran bayi baru lahir adalah menemukan gangguan pendengaran sedini mungkin sehingga dapat dilakukan habilitasi segera, menggunakan pemeriksaan elektrofisiologi yang bersifat obyektif, praktis, otomatis dan non invasif.⁽⁹⁾

Menurut *The Joint Committee on Infant Hearing (JCIH)* tahun 2007 terdapat perbaikan dari konsensus yang ada pada tahun 2000, terutama dari target skrining gangguan pendengaran yang awalnya hanya terdiri dari gangguan pendengaran kongenital bilateral, gangguan pendengaran konduktif permanen, gangguan pendengaran sensori unilateral, ditambahkan dengan gangguan pendengaran neural yang salah satu contohnya adalah gangguan pendengaran neuropati audiotori pada bayi dengan riwayat perawatan di ruang intensif lebih dari 5 hari. Sehingga pada bayi dengan riwayat perawatan di ruang intensif lebih dari 5 hari, pemeriksaan *auditory brainstem response (ABR)* merupakan skrining awal yang harus dilakukan.⁽⁸⁾

I. Embriologi Telinga Dalam, Anatomi dan Fisiologi Pendengaran

Embriologi telinga dalam mulai berkembang pada minggu ketiga usia gestasi, dan pada minggu ke 20 pematangan koklea sudah mencapai

ukuran dan fungsi dewasa yang sudah dapat memberi respons terhadap suara.⁽¹⁰⁾

Labirin terletak pada pars petrosa os temporal yang mengandung organ pendengaran dan keseimbangan.^(11,12) Labirin terdiri dari labirin bagian tulang dan labirin bagian membran. Labirin bagian tulang terdiri dari kanalis semisirkularis, vestibulum dan koklea sedangkan labirin bagian membran terdiri dari utrikulus, sakulus, sakus dan duktus endolimfatikus. Antara labirin bagian tulang dan membran terdapat suatu ruangan yang berisi cairan perilimfe yang berasal dari cairan serebrospinalis dan filtrasi dari darah. Didalam labirin bagian membran terdapat cairan endolimfe yang diproduksi oleh stria vaskularis dan diresorpsi pada sakkus endolimfatikus.^(12,13)

Koklea terdiri dari 2 3/4 putaran spiral. Dasar spiral menjorok ke telinga tengah sebagai *promontory* dinding medial telinga tengah. Potongan melintang dari koklea menunjukkan bahwa koklea dibagi menjadi tiga segmen. Dari atas ke bawah adalah skala vestibuli, skala media dan skala timpani. Setiap skala berisi cairan. Pada skala media berisi cairan endolimfe dan pada skala vestibuli dan skala timpani berisi cairan perilimfe. Pertemuan antara perilimfe dari skala vestibuli dan skala timpani pada puncak koklea pada titik yang dikenal sebagai helicon-trema.^(12,13)

Koklea memiliki volume sekitar 0,2 mililiter. Dalam ruang ini terdapat lebih kurang 30.000 sel-sel rambut yang mentransduksi getaran menjadi impuls saraf dan sekitar 19.000 serat saraf yang mengirimkan sinyal ke dan dari otak.⁽¹³⁾

Terdapat 2 tipe sel rambut yang terdapat dalam organ corti, yaitu satu baris sel rambut dalam dan 3 baris sel

rambut luar. Masing-masing sel ini mempunyai fungsi yang berbeda. Sel rambut dalam mempunyai fungsi utama untuk mentransmisikan sinyal bunyi sampai ke otak. Sembilan puluh lima persen dari serabut saraf pendengaran yang membawa transmisi sinyal bunyi sampai ke otak (serabut afferen) hanya berkontak dengan sel rambut dalam, sehingga sinaps antara sel rambut dalam dengan serabut afferen merupakan relay pertama pada jaras pendengaran. Sel rambut luar menerima sinyal berkisar 5% dari serabut afferen dan juga berhubungan dengan serabut efferen yang meneruskan umpan balik dari otak ke organ pendengaran.⁽¹⁰⁾

Proses transmisi suara di koklea dimulai dengan energi akustik yang menghasilkan aksi seperti piston dengan landasan tulang stapes pada foramen oval. Energi tersebut akan diteruskan ke perilimfe di skala vestibuli dan menggetarkan membran Reissner dan akan menggetarkan endolimf di skala media, sehingga terjadi pergeseran membran basilaris. Pergeseran membran basilaris membentuk gelombang berjalan dengan amplitudo. Besarnya amplitudo sesuai dengan besar frekuensi rangsangan yang diterima. Membran basilaris lebih kaku pada bagian basal dibandingkan apeks, sehingga perjalanan gelombang bergerak dari basal ke apeks.^(10,14,15)

Getaran membran basilaris menimbulkan gerak relatif dengan membran tektoria yang merupakan rangsangan mekanik. Rangsangan mekanik ini menyebabkan defleksi stereosilia sel-sel rambut sehingga terjadi pelepasan ion-ion bermuatan listrik. Pada proses ini terjadi perubahan energi mekanik menjadi energi listrik (proses transduksi). Defleksi sel-sel rambut akan membuka saluran ion kalsium sehingga ion kalsium keluar

dan merangsang vesikel untuk melepaskan neurotransmitter.

Neurotransmitter pada sinaps dan menghasilkan potensial aksi yang kemudian diteruskan ke serabut saraf delapan menuju nukleus koklearis. Impuls listrik pada nukleus koklearis akan berjalan ke nukleus olivarius homolateral dan sebagian impuls akan diteruskan ke lemniskus lateralis, kemudian menuju kolikulus inferior. Selanjutnya impuls tersebut diteruskan ke korteks auditorius yang terletak di area 41 Broadman padagirus temporalis superior.

II. Asfiksia Perinatal

Asfiksia perinatal didefinisikan sebagai kegagalan bernafas spontan dan teratur saat bayi lahir dan sesaat setelah lahir ditandai dengan hipoksemia, hiperkapnia dengan asidosis metabolik. Asfiksia dapat terjadi selama antepartum, intrapartum dan postpartum dengan penyebab bisa faktor ibu, faktor bayi dan faktor placenta.^(1,22,23)

The American Academy of Pediatrics (AAP) dan *The American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) memberikan karakteristik asfiksia perinatal :⁽¹⁶⁾

1. Asidosis ($\text{pH} < 7.00$),
2. Skor Apgar 0-3 menetap lebih dari 5 menit,
3. Terdapat manifestasi neurologi : kejang, hipotoni, HIE, koma,
4. Didapatkan disfungsi multiorgan.

Asfiksia perinatal sebagai faktor penyebab gangguan pendengaran pada bayi dengan Apgar skor 0-4 pada 1 menit pertama, dan 0-6 pada 5 menit berikutnya.^(6,7)

III. Mekanisme Terjadinya Gangguan Pendengaran Pada Asfiksia

Asfiksia menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi sel rambut dalam yang dapat mengakibatkan perubahan

pada neuron pendengaran. Menurut satu teori⁽¹⁸⁾ pelepasan spontan pada neuron pendengaran merupakan hasil dari pelepasan spontan transmitter oleh sel rambut. Dengan adanya rangsangan suara akan menyebabkan depolarisasi dari sel rambut yang akan mengakibatkan peningkatan pelepasan transmitter kimia dan loncatan saraf.

Pada asfiksia akan terjadi hiperpolarisasi dari sel rambut yang akan mengakibatkan penurunan jumlah transmitter yang dilepaskan dan berakibat penurunan dari aktivitas saraf.^(18,19)

Jiang dkk. menjelaskan mekanisme cedera neuronal sekunder pada hipoksia yang menyebabkan terjadinya iskemia sehingga terjadi penurunan pasokan darah ke bagian tubuh. Pada keadaan hipoksia-iskemia menyebabkan pelepasan glutamat yang berlebihan pada celah saraf sinaptik, menyebabkan gangguan pada transmisi sinaptik dan menyebabkan kerusakan permanen pada neuron.⁽²⁰⁾

Pada keadaan awal terjadinya hipoksia akan ada suatu autoregulasi dari tubuh untuk melindungi otak dari kerusakan. Kompensasi awal adalah adanya peningkatan aliran darah ke otak (*Cerebral Blood Flow*), hal ini disertai dengan redistribusi curah jantung ke organ tubuh esensial, termasuk otak, jantung, dan kelenjar adrenal. Tekanan darah (*Blood Pressure*) akan meningkat karena peningkatan pelepasan epinefrin. Apabila kompensasi awal gagal, aliran darah ke otak bisa menjadi tekanan-pasif, di mana waktu perfusi otak tergantung pada tekanan darah sistemik. Ketika tekanan darah menurun maka aliran darah ke otak juga menurun di bawah tingkat kritis dan cedera otak sekunder dapat terjadi.⁽²²⁾

Hal ini menyebabkan kegagalan energi intraseluler. Selama fase awal

cedera otak, suhu otak menurun, dan terjadi pelepasan neurotransmitter lokal, seperti gamma-aminobutyric transaminase acid (GABA). Perubahan ini mengurangi kebutuhan oksigen di otak untuk meminimalkan dampak dari asfiksia. Pada tingkat seluler proses kerusakan akibat hipoksia ini terus berlanjut tergantung dari lama dan keparahan hipoksia. Proses selanjutnya terjadi peningkatan pelepasan reseptor asam amino, peningkatan glutamat pada sinaps, peningkatan radikal bebas dan nitrit oksida dan proses selanjutnya akan berakibat terjadinya cytotoxic edema dan kematian sel nekrotik.⁽²²⁾

Pada rekaman *Auditory Brainstem Respon* serial pada saat terlihat tingkat kerusakan, Hal ini diperkirakan sebagai hasil dari metabolisme energi dan apoptosis yang terganggu menyebabkan kematian sel beberapa jam atau hari setelah kejadian hipoksia.^(20,21)

IV. Gambaran BERA dan OAE Pada Bayi Dengan Asfiksia

Gambaran BERA

Pemeriksaan BERA adalah suatu pemeriksaan elektrofisiologik yang obyektif, non invasif untuk menilai respons sistim auditorik termasuk batang otak terhadap bunyi, sehingga dapat diketahui ambang pendengaran maupun letak lesi pada sistim auditorik tsb.⁽²³⁾

Pemeriksaan BERA bisa digunakan untuk mengevaluasi status sistem pendengaran pada bayi setelah episode asfiksia perinatal dengan riwayat Apgar 5 menit kurang dari 6 dan klinis tanda-tanda iskemik hipoksia ensefalopati (Hypoxic Ischemic Encephalopathy). Pemeriksaan BERA dilakukan setelah kondisi bayi stabil. Sebelum dilakukan tes BERA diperiksa

terlebih dahulu apakah terdapat kelainan lokal pada telinga seperti kelainan kongenital.

Pada pemeriksaan BERA gelombang positif direkam selama 10 detik pertama setelah rangsangan klik. Terdiri dari gelombang I-VII pada lokasi yang spesifik. Normalnya stimulus klik akan menghasilkan respons dari sel-sel rambut koklea, dan sinyal akan bergerak sepanjang jalur pendengaran dari kompleks nukleus koklearis ke kolikulus inferior di batang otak menghasilkan gelombang I- V.^(2,20,21)

Dari penelitian yang dilakukan Misra P.K dkk, menunjukkan hasil bahwa lamanya waktu pemanjangan masa laten dan interval berhubungan dengan derajat asfiksia, terutama pada minggu pertama. Sehingga intervensi dini dapat mencegah dan mengurangi kerusakan yang permanen.^(2,20)

Pada bayi dengan asfiksia perinatal pada hari ketiga semua masa laten dan interval meningkat signifikan dibandingkan kontrol normal. Setelah itu, masa laten dan interval menurun secara progresif. Pada hari ketujuh, masa laten gelombang V dan semua interval masih berbeda secara signifikan dari subyek kontrol. Pada hari kesepuluh dan kelima belas, semua interval menurun secara signifikan. Pada hari ke tiga puluh, semua masa laten gelombang menurun sampai dengan nilai-nilai dalam subyek kontrol normal, interval juga mendekati nilai normal, meskipun interval gelombang III-V dan I-V masih meningkat sedikit.⁽²⁾

Kelainan pada gambaran BERA yang ditemukan berhubungan erat dengan derajat asfiksia dan durasi waktu kejadian asfiksia.⁽²⁾

Dari penelitian lain disimpulkan juga bahwa kelainan gambaran BERA pada bayi baru lahir dengan asfiksia

bersifat sementara dan kembali normal pada usia 3 bulan. Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan BERA terhadap 30 bayi baru lahir yang mengalami asfiksia dengan nilai apgar skor kurang dari 6 sampai 5 menit didapatkan 43,3% terdapat beberapa kelainan pada gambaran BERA, dimana terdapat masa laten yang memanjang dari beberapa gelombang. Setelah 3 bulan kemudian dilakukan evaluasi ulang, dan didapatkan perbaikan gambaran BERA menjadi normal pada 16 kasus.^(2,21,23)

Gambaran Otoacoustic Emission (OAE)

Skrining pendengaran pada bayi-bayi dapat dilakukan dengan baik dengan menggunakan alat emisi otoakustik, karena metoda ini: obyektif, aman, tidak memerlukan prosedur yang invasif atau pengobatan sebelum dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan-nya cepat, hanya memerlukan waktu beberapa detik sampai menit; caranya mudah, tidak memerlukan keahlian khusus, biaya alat yang relatif murah.^(21,24,25)

Hasil pemeriksaan mudah dibaca karena dinyatakan dengan kriteria *pass* (lulus) atau *refer* (tidak lulus). Hasil *Pass* menunjukkan keadaan koklea baik, sedangkan hasil *refer* artinya adanya gangguan koklea sehingga dibutuhkan pemeriksaan lanjutan berupa AABR atau BERA pada usia 3 bulan. Hasil OAE dipengaruhi oleh gangguan atau adanya sumbatan pada liang telinga dan kelainan pada telinga tengah (misalnya cairan).^(25,26)

Untuk skrining pendengaran, digunakan OAE skrining (*OAE screener*) yang memberikan informasi kondisi koklea pada 4 - 6 frekuensi. Sedangkan untuk diagnostik digunakan OAE yang mampu memeriksa lebih banyak lagi frekuensi tinggi.⁽²⁵⁾

Suatu penelitian dengan *Distortion product otoacoustic emissinos* (DPOAEs) terhadap bayi dengan asfiksia memberikan gambaran bahwa terdapat gangguan pada fungsi koklea bayi dengan asfiksia perinatal terutama pada frekuensi 1-5 kHz yang terdeksi pada hari ketiga sampai lima kelahiran, dan terdapat perbaikan pada usia 1 bulan.⁽²⁷⁾

Penelitian ini dilakukan pada 46 bayi baru lahir yang mengalami asfiksia perinatal untuk mengidentifikasi frekuensi yang dipengaruhi asfiksia perinatal. Pada hari ke tiga sampai hari kelima kelahiran, di dapatkan hasil *pass* pada f_2 nada utama di frekuensi antara 1 dan 10 kHz, sedangkan pada frekuensi 1-5 kHz didapatkan penurunan dibandingkan pada bayi yang tidak mengalami asfiksia perinatal. Pada usia 1 bulan dilakukan pemeriksaan ulang didapatkan hasil *pass* pada hampir semua frekuensi, meskipun pada frekuensi 1-2 kHz masih terdapat sedikit penurunan.⁽²⁷⁾

Dari suatu penelitian lain yang dilakukan di RSUP Dr. Sardjito pada bayi baru lahir dengan asfiksia yang dirawat pada periode Januari–Juni 2011 didapatkan pemeriksaan emisi otoakustik dari 31 bayi baru lahir dengan asfiksia tanpa penyulit lain adalah *pass* bilateral pada 15 bayi (48,39%) dan *refer* baik bilateral maupun unilateral sebanyak 16 bayi (51,61%).⁽²⁸⁾

V. Tatalaksana Asfiksia Perinatal dan akibat yang ditimbulkan

Dari pemeriksaan BERA dan OAE didapatkan gangguan pada fungsi pendengaran di periode awal bayi baru lahir dengan riwayat asfiksia, dan didapatkan perbaikan pada usia 1 bulan. Disini sangat penting manajemen pada bayi dengan asfiksia perinatal untuk mencegah kerusakan otak yang lebih lanjut akibat terjadinya *hypoxic-*

ischemic encephalopathy, baik manajemen secara farmakologi maupun non farmakologi.^(27,29,30)

Salah satu manajemen asfiksia perinatal non farmakologi saat ini adalah dengan metode hipotermi. Walaupun belum dapat didefinisikan secara pasti, teknik hipotermi dapat melindungi kerusakan neuron otak dengan mengurangi tingkat metabolisme serebral, mengurangi pelepasan asam amino (glutamat, dopamin), menurunkan produksi nitrat oksida beracun dan radikal bebas.^(29,30)

Teknik hipotermi dilakukan dengan menempatkan bayi pada selimut pendingin yang dengan cepat menurunkan suhu tubuh sekitar 33 derajat Celcius. Bayi didinginkan selama 72 jam dan kemudian secara bertahap kembali dihangatkan sampai suhu tubuh normal. Selama proses hipotermi, kondisi bayi selalu dipantau dengan amplitudo terintegrasi electro encephalogram (aEEG), pemeriksaan neurologis serial, laboratorium dan studi pencitraan sebelum, selama dan setelah prosedur. Teknik hipotermi ini hanya dapat dilakukan dalam waktu enam jam setelah kelahiran dan sebaiknya sesegera mungkin.⁽³¹⁾

Pada gangguan pendengaran sensorineural yang menetap dan cukup berat harus dilakukan habilitasi berupa amplifikasi pendengaran, misalnya dengan alat bantu dengar (ABD). Disamping pemberian alat bantu dengar juga diperlukan habilitasi wicara berupa terapi wicara atau terapi audioverbal (AVT) sehingga anak dapat belajar mendeteksi suara dan memahami percakapan agar mampu berkomunikasi dengan optimal.

American Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) merekomendasikan bahwa bila skrining pendengaran pada bayi telah dimulai pada usia 2 hari, kemudian diagnosis dipastikan pada

usia 3 bulan sehingga habilitasi yang optimal dapat dimulai pada usia 6 bulan; maka pada usia 36 bulan diharapkan kemampuan wicara anak hampir sama dengan anak yang memiliki pendengaran normal.⁽⁸⁾

Pemasangan ABD harus berdasarkan seleksi ABD yang tepat dan proses *fitting* yang sesuai dengan kebutuhan sehingga diperoleh amplifikasi yang optimal. Proses *fitting* ABD pada bayi/anak jauh lebih sulit dibandingkan orang dewasa. Akhirnya ini ambang pendengaran yang spesifik pada bayi dapat ditentukan melalui teknik *Auditory Steady State Response (ASSR)*, yang hasilnya dianggap sebagai prediksi audiogram, sehingga proses *fitting* ABD bayi lebih optimal. Bila ternyata ABD tidak dapat membantu, salah satu alternatif adalah implantasi koklea.

KESIMPULAN

- Asfiksia perinatal merupakan salah satu faktor resiko gangguan pendengaran pada anak.
- Asfiksia menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi sel rambut dalam yang mengakibatkan penurunan jumlah transmiter yang dilepaskan sehingga terjadi penurunan aktivitas saraf. Asfiksia juga mengakibatkan peningkatan glutamat dan gangguan proses apoptosis.
- Kelainan gambaran BERA pada bayi dengan asfiksia perinatal adalah terjadinya peningkatan masa laten dan interval gelombang, kelainan ini dapat bersifat sementara atau menetap tergantung dari derajat asfiksia dan durasi waktu kejadian asfiksia
- Dari pemeriksaan dengan DPOAEs didapatkan gangguan pada fungsi koklea bayi dengan asfiksia perinatal terutama pada frekuensi 1-5 kHz yang terdeksi pada hari ke

tiga sampai lima kelahiran, dan terdapat perbaikan pada usia 1 bulan.

- Manajemen pada bayi dengan asfiksia perinatal sangat penting untuk mencegah kerusakan otak yang lebih lanjut akibat terjadinya *hypoxic-ischemic encephalopathy* baik secara farmakologi maupun non farmakologi.
 - Salah satu manajemen asfiksia perinatal saat ini adalah dengan metode hipotermi yang dapat melindungi kerusakan neuron otak dengan mengurangi tingkat metabolis meserebral, mengurangi pelepasan asam amino (glutamat, dopamin), menurunkan produksi nitratoksida beracun dan radikal bebas.
 - Pada gangguan pendengaran sensorineural yang menetap dan cukup berat harus dilakukan rehabilitasi berupa amplifikasi pendengaran, misalnya dengan alat bantu dengar (ABD), bila ternyata ABD tidak dapat membantu, salah satu alternative adalah implanta-sikoklea.
- inthe preterm infant. *Neuropsychology* 2003 :17(1)3-13.
4. Hall JG. On the neuropathological changes in the central nervous system following neonatal asphyxia with special reference to the auditory system in man. *Acta Otolaryngol.* 1964 Supplemen.188.
 5. Wu YW, Backstrand KH, Zhao S, Fullerton HJ, Johnston SC. Declining diagnosis of birth asphyxia in California: 1991-2000. *Pediatrics* 2004;114; 584.
 6. Rajendran V, Roy FG. An overview of motor skill performance and balance in hearing impaired children. *Journal of Pediatrics* 2011 37:33.
 7. Taghdiri MM, Eghbalian F, Emami F, Abbasi b, Zandevakili H, et al. Auditory Evaluation of high risk newborn by automated auditory brain stem response. *Iran J Pediatr* 2008; 18(4): 330-4.
 8. *Joint committee on infant hearing.* Principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. *Pediatrics* 2007;120; 898.
 9. Grill E, Hessel F, Siebert U, Schnell P, Kunze s, et al. Comparing the clinical effectiveness of different new-born hearing screening strategies. A decision analysis. *BMC public health* 2005;5:12.
 10. Hill M. Development of the organs of audition and equilibrium inner ear. *UNSW Embryology.* 2010.
 11. Glowatzki E. Afferent synaptic transmission by cochlear hair cells

KEPUSTAKAAN

1. Majeed R, Memon Y, Majeed F, Shaikh NP, Rajar UDM. Risk factors of birth asphyxia. *J Ayub Med Abbottabad* 2007: 19(3): 67-71.
2. Misra P.K, Katiyar C.P, Kapoor R.K, Shukla R, Malik G.K, et al. Brainstem auditory evoked reponse in neonates with birth asphyxia. *Indian Pediatrics* 1997: 34:199-204.
3. Golightly TH, Raz S, Sander CJ. Influence of slight to moderate risk for birth hypoxia on acquisition of cognitive and language function

- structure and function. Johns Hopkins School of Medicine;2011.
12. Brown MC, Nuttall AL, Masta RI, Lawrence M. Cochlear inner hair cells: Effects of transient asphyxia on intracellular potentials. *Hearing Research* 1983; 9:131-44.
 13. Alberti PW. The anatomy and physiology of the ear and hearing. WHO international. 2001 (2):55-62.
 14. Mills JH, Khariwala S, Weber PC, Anatomy And Physiology of Hearing. In: Bailey BJ, Johnson JT, editors. *Head and Neck Surgery – Otolaryngology*, 4th ed. Lippincott Williams&Wilkins Publisers; 2006. p.1883-903.
 15. Austin Df. Anatomy of the Ear. In: Ballenger JJ, Snow JB, editors. *Otorhinolaryngology head and neck surgery*, 15th ed. Baltimore: Williams & Wilkins;1996. p. 838-57.
 16. American Academy of Pediatrics. The Apgar Score. The American college of obstetrician and gynecologists. 2006: 117(4); 1444-7.
 17. Lincetto O. Birth asphyxia-summary of the previous meeting and protocol overview. World Health Organization Geneve;2007.
 18. Davis H, Fernandez C, McAuliffe D.R. The excitatory process in the cochlea. Central institute for the deaf, St. Louis, Missouri. 1950; 36; 580-7.
 19. Kim D.O, Molnar C.E. A population study of cochlear nerve fibers: Comparison os spatial distributions of average-rate and phase-locking measures of responses to single tones. *Journal of Neurophysiology*. 1979; 42(1): 16-30.
 20. Jiang ZD, Brosi DM, Wang J, Xu, Chen GQ, Shao XM, et al. Time course of brainstem pathophysiology during first month in term infants after perinatal asphyxia, revealed by MLS BAER latencies and intervals. *Pediatric Research*. 2003, 54(5): 680-87.
 21. Davies LM. Effects of perinatal hypoxia on frequency-specific auditory brainstem responses in the chick (dissertation). James Madison University: 2009.
 22. American Academy of Pediatrics. Relation between perinatal factors and neurological outcome. In: *Guidelines for Perinatal Care*. 3rd ed. Elk Grove Village, Ill: American Academy of Pediatrics; 1992: 221-34.
 23. Jiang ZD, Brosi DM, Shao XM, Wilkinson AR. Sustained depression of brainstem auditory electrophysiology during the first month in term infants after perinatal asphyxia. *Clinical Neurophysiology*. 2008, 119: 1496-505.
 24. Watkin. Outcomes of neonatal screening for hearing loss by otoacoustic emission. *Archives of Disease in Childhood* 1996, 75:158-68.
 25. Hall JW. A guide to otoacoustic emissions for otolaryngologists. Maico diagnostic : 2009.

-
26. Kemp DT. Otoacoustic emissions, their origin in cochlear function, and use. *British Medical Bulletin* 2002; 63: 223-41.
27. Jiang ZD, Zhang Z, Wilkinson AR. Distortion product otoacoustic emissions in term infants after hypoxia-ischaemia. *Eur J Pediatr* 2005 ; 164: 84-87.
28. Sudarman K, Hakim L. Gambaran OAE pada bayi dengan riwayat asfiksia di RSUP Dr. Sardjito periode Januari 2011-2011. *Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL FK UGM /RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta*. 2011.
29. Jacobs SE, Mordi WO. Therapeutic hypothermia for newborn infants with hypoxic-ischaemic encephalopathy. *Journal of Paediatrics and Child Health* 2010. 46: 568-76.
30. Polin RA, Randis TM, Sahni R. Systemic hypothermia to decrease morbidity of hypoxic-ischemic brain injury. *Journal of Perinatology* 2007. 27: 47-58.
31. Hansen A, Soul J. New induced hypothermia protocol. *Pediatric Views*; February 2008.